

# ゼオサット Zeosat

## 特長

- ◎乾燥酵母、分解菌、有用菌を高品質ゼオライトに吸着させた資材です。
- ◎土壤有機物・作物残渣の分解を促進し、地力を回復・強化します。
- ◎土壤の生物性を改善し、病害性糸状菌の繁茂を抑制します。
- ◎強力な有用菌との相乗効果で連作障害の軽減に寄与します。
- ◎高品質ゼオライトを使用しており、保肥力向上に役立ちます。

## 使用量・使用時期

使用目的	使用時期	標準使用量(反当り)	使用時のポイント
残渣分解	収穫後	2~5袋	低温時は多めに施用してください
連作障害対策	土壤消毒後	3~10袋	連作障害の程度に合わせ増減ください
地力増強	基肥時	3~5袋	肥料との同時施用できます
堆肥化促進	切り返し前	堆肥原料の乾物重 5~10%程度	使用後1か月程度は醜化させる

あらゆる作物へご使用いただけます。土壤条件、作物に合わせて増減してください。

## 使用上の注意

- ◎本品は農薬ではありません。継続使用で、有用菌が住み着く環境が整い効果が安定して現れます。  
具体的には以下の3点にご留意ください。
  - ①圃場の排水・保水性の改善を行う
  - ②土壤pHの調整を行う(有用菌は弱酸性~中性域を好みます)  
強アルカリ資材との併用は避け、併用する場合は本材の使用量を基準以上としてください。
  - ③エサとなる有機物の補給する(完熟堆肥等との併用が望ましい)
- ◎土壤消毒剤との同時施用は効果の減少を招きますのでお避けください。  
本材の効果を最大限に引き出すために、土壤消毒後に施用することを推奨します。
- ◎散布後は紫外線を避ける工夫(散布後即時土壤混和、マルチ設置、曇天時散布等)を行うことで、  
分解菌・有用菌の繁殖が活発に進み、効果が現れやすくなります。
- ◎キノコ栽培の近隣圃場では使用を避けてください。  
本資材に含まれる有用菌は、キノコ類に対して強い拮抗作用があります。
- ◎本品は保管状況によっては、袋内での有用菌の繁殖が見られることがあります。緑色又はベージュ  
色の綿状のものは有用菌でご使用において何ら問題なく、また品質を損なうものではありません。